

# BIOSEKURITI

## STRATEGI PENCEGAHAN PENYEBARAN PMK

Biosekuriti dapat mencegah Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Seluruh pihak, termasuk petugas di lapangan perlu memahami dan menerapkannya

### BIOSEKURITI DI PETERNAKAN

#### Prosedur

#### Peternakan

- 

**Petugas** Wajib didisinfeksi sebelum masuk ke area peternakan.  
Menggunakan APD, (Sarung tangan, sepatu bot, apron dan masker)
- 

**Tamu/masyarakat umum** Dilarang mengunjungi peternakan lain (minial 3 x 24 jam)  
Mengikuti prosedur biosekuriti yang berlaku sesuai SOP
- 

**Kendaraan** Wajib dibersihkan dan disinfeksi, terutama pada bagian roda, kolong dan bak penampungan
- 

**Barang** Wajib disanitas dan disinfeksi
- 

**Kandang dan Peralatan** Disinfeksi di kandang serta peralatan secara berkala
- 


**Ternak** Karantina 14 hari terhadap ternak baru yang masuk lokasi peternakan  
Amati gejala klinis PMK



### BIOSEKURITI PADA PELAYANAN REPRODUKSI

#### Prosedur

#### Pelayanan Reproduksi



**Petugas IB/PKB**

Menggunakan APD, (Sarung tangan, sepatu bot, apron dan masker)  
Menggandi APD saat melayani ternak untuk setiap peternakan lainnya



#### Prosedur

#### Pelayanan Reproduksi



**Ternak yang akan di-IB/PKB**

Ternak tampak sehat & tidak menunjukkan gejala klinis PMK  
Dibersihkan dan di tempatkan dalam kandang atau tempat pelaksanaan IB/PK

IB/PKB dalam kondisi bersih